

欄1	欄2	欄3
藥號	藥名	備註
20C010	Neoral (25mg)膠囊.注意劑量	油狀藥物, 不宜磨粉(建議改用cyclosporin Sol'n)
20C028	Neoral (100mg)膠囊.注意劑量	油狀藥物, 不宜磨粉
20C060	Xalkori(250mg)膠囊.(自費)	
20D017	Endase (5mg)腸溶錠.	腸溶錠,磨粉可能失去藥效
20D025	Sprycel (50mg)錠.	
20E072	Afinitor (5mg)錠.	
20M028	Cell Cept (250mg)膠囊.	具致癌性,請保持劑型之完整性
20M078	Lysodren (500mg)錠.	具致癌性,請保持劑型之完整性
20M094	Myfortic (180mg)錠.	1)具致癌性,請保持劑型之完整性 2)腸溶膜衣錠劑型
20N017	Tasigna(150mg)膠囊	
20P003	Votrient (200mg)錠	
20T028	Prograf (1mg)膠囊.注意劑量劑型	具致癌性,請保持劑型之完整性
20T104	Prograf(0.5mg)膠囊.注意劑量	具致癌性,請保持劑型之完整性
20T112	Advagraf (1mg)持續藥效膠囊	1)具致癌性,請保持劑型之完整性2)持續釋放劑型
20T120	Advagraf(0.5mg)持續藥效膠囊	1)具致癌性,請保持劑型之完整性2)持續釋放劑型
20T146	Advagraf(5mg)持續藥效膠囊	
21C026	Cleocin (150mg)膠囊.	磨粉後刺激口腔粘膜
21D023	Videx EC (250mg)膠囊.	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半
21H039	Harvoni 錠.(28's/Bt.)自費	
21N065	Viramune XR(400mg)長效錠	
21S028	Salazopyrin(500mg)腸衣錠.	腸溶錠, 不宜磨粉或剝半
21S036	Sovaldi(400mg)錠.28'S/BT.	
21V045	Valcyte (450mg)錠.	具致癌或致畸胎藥物
22D022	Suboxone(2/8mg) 舌下錠.	
22M008	MST (30mg)長效錠	持續釋放劑型, 不宜剝半或磨粉 (建議改用morphine 10 mg或Fentanyl TTS)
22T023	Tramal(100mg)持續錠.	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半 (建議改用Tramadol 50 mg)
23A216	Strattera(10mg)膠囊.注意劑量	粉末對眼睛與皮膚具刺激性,不可打開膠囊.
23A224	Strattera(18mg)膠囊.注意劑量	粉末對眼睛與皮膚具刺激性,不可打開膠囊.
23A232	Strattera(25mg)膠囊.注意劑量	粉末對眼睛與皮膚具刺激性,不可打開膠囊.

23A240	Strattera(40mg)膠囊.注意劑量	粉末對眼睛與皮膚具刺激性,不可打開膠囊.
23B110	Wellbutrin (150mg) SR錠	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半
23B128	Wellbutrin(150mg) XL錠	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半
23G012	Voltaren(100mg)SR錠.	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半 (建議改用Voren 25 mg)
23M006	Madopar HBS (125mg)膠囊. 注意	持續釋放劑型,膠囊不可打開 (建議改用Madopar 125 mg)
23M141	Remeron (30mg) 口溶錠	口溶錠(建議改以直接泡於水中,溶解後服用)
23M159	Concerta (18mg) E.R.錠	持續釋放劑型,不宜剝半或磨粉(建議改用Methylphenidate 10mg Tab.)
23N079	Naprosin(750mg)S.R.錠.	持續釋放劑型, 建議整粒吞服 (建議改用其他NSAIDs)
23P065	Clarinase Repetabs錠.	特殊複效錠, 不宜磨粉或剝半 (建議改用Nasco)
23P176	Invega (3mg)E.R錠(注意劑量)白	持續釋放劑型, 不宜剝半
23P203	Invega (9mg)E.R錠(注意劑量)紅	持續釋放劑型, 不宜剝半
23V110	Efexor XR (75mg) 膠囊	持續釋放劑型,不宜剝半或磨粉
23V128	Efexor XR (37.5mg)S.R.膠囊	持續釋放劑型,不宜剝半或磨粉
23Z057	Stilnox CR(6.25mg)長效錠.注意	
24D085	Cardizem Retard(90mg)錠.	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半 (建議改用Hebesser)
24D138	Doxaben(4mg)XL錠.注意劑量	
24F021	Plendil (5mg) S.R.錠.	持續釋放劑型, 不宜剝半或磨粉 (建議改用其他鈣離子阻斷劑)
24F055	Lescol XL (80mg) 錠	持續釋放劑型,不宜磨粉 (建議改用Zocor或Lipitor)
24L057	Lipo-merz Retard (500mg) 膠囊.	油狀藥物, 不宜磨粉
24N043	Adalat (5mg) 軟膠囊.注意劑量	油狀藥物,不宜磨粉或撥半
24N051	N.T.G(0.6mg)舌下錠.	舌下錠劑型
24N104	Adalat OROS 30 錠.注意劑量	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半(建議改用其他鈣離子阻斷劑)
24N138	Nicorette (4mg) 咀嚼錠.	咀嚼錠劑型
24T053	Forflow(400mg)錠.	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半
25D009	Regrow (60mg)S.R.錠.	持續釋放劑型, 不宜剝半或磨粉 (改用Medicon-A)
26D031	Dulcolax(5mg)腸溶錠	腸溶錠,磨粉可能引起腸胃刺激(建議改用castor oil)
26D065	DexiLant (60mg)緩釋膠囊.	
26L037	Takepron (30mg) 口溶錠.	口溶錠(建議改以直接泡於水中,溶解後服用)
26M076	Gastro-Timelets(30mg) 膠囊.	持續釋放劑型, 不宜剝半或磨粉 (建議改用primperan 3.84 mg)
26P112	Pantoloc (40mg)腸溶錠.	腸溶膜衣錠劑型
27A070	Fosamax (70mg) 錠.	易造成口咽潰瘍, 不宜磨粉或剝半

27A088	Fosamax Plus (70mg) 錠.	易造成口咽潰瘍, 不宜磨粉或剝半
27A115	Zytiga (250mg)錠.	
27A226	Fosamax Plus(70mg/5600IU)錠.	易造成口咽潰瘍, 不宜磨粉或剝半
27C066	Bonfos (400mg) 膠囊.	刺激口咽黏膜, 不宜剝半或磨粉
27I018	Roaccutane (20mg) 軟膠囊.	磨粉易變質或影響藥效
27S026	Slow-k (600mg) 錠.	持續釋放劑型, 建議整粒吞服
27Z009	Zinca (50mg) 膠囊	
28O042	Ditropan(5mg)緩釋錠.	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半
28S032	Vesicare(5mg)錠.	
28T013	Detrusitol (4mg) S.R.膠囊.	持續釋放劑型, 不宜磨粉或剝半