

# 604：藥物衛教單張編號

## 雙基胜肽酶抑制劑(DPP-4 inhibitors)(單方)藥物使用須知

學名	商品名	中文名	含量	藥品外觀	藥號
Linagliptin	Trajenta	糖漸平 膜衣錠	5mg/顆		27L069
Saxagliptin	Onglyza	昂格莎 膜衣錠	5mg/顆		27S076
Sitagliptin	Januvia	佳糖維 膜衣錠	100mg/顆		27S068
Vildagliptin	Galvus	高糖優適 錠	50mg/顆		27V154

◎ 作用

治療第二型糖尿病。

◎ 用法

請遵照醫師處方服用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。

◎ 注意事項

1. 主動告知醫師您所有服用之降血糖藥物，並勿擅自服用未經醫師許可之藥物。
2. 有以下情況請告知醫師：有肝、腎疾病、懷孕或授乳
3. 服藥期間飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
4. 服藥期間如有高血糖症狀（極度口渴、多尿、皮膚乾燥、複視、噁心嘔吐等）或曾出現低血糖症狀（極度飢餓、焦慮、皮膚蒼白、冒冷汗、視力模糊或意識混淆等）時，應於回診時主動告知醫師，以利劑量之調整。
5. 請確實遵從醫囑回診及實行相關檢驗，如：血糖、尿糖，以便醫師評估療效或調整劑量。

◎ 相關副作用

常見之副作用：頭痛、鼻咽炎、上呼吸道感染。

不常見，但還是可能發生。如：過敏反應、生殖泌尿道感染、關節痛、胰臟炎(嚴重腹痛、背痛、噁心、嘔吐)等。

◎ 忘記服藥時之處置

若您是規律性的服用此藥，則請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。

◎ 若您於服藥期間發生下述狀況時，請立即回診就醫：

嚴重低血糖合併發生痙攣、昏迷。

若您出現低血糖症狀。請參照醫護人員對您的建議處置（如：立即食用含糖飲料或方糖等物品），若症狀未見改善甚至加劇時，則應在旁人的陪同下立即回診。

◎ 藥品儲存處置

1. 除非藥品另有標示使用期限外，一般效期為開方期限後三個月。

2. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。

3. 請將藥品存放於兒童不易取得之處所。

※ 若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

·奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw

·柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw

·佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw

·藥物查詢網站：

[http://www.chimei.org.tw/main/cmh\\_department/55500/drugsearch.htm](http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm)