

食物—藥物交互作用05

葡萄柚汁與降血脂藥物

| 商品名 | 學名 | 中文名 | 外觀 |
|---------------------|---------------------------------|-------|--|
| Lipitor (40mg) 錠 | Atorvastatin (40mg) | 立普妥 |  更新日期:2016.03.17 |
| Vytorin (10/20mg) 錠 | Ezetimibe/simvastatin (10/20mg) | 維妥力錠 |  更新日期:2015.04.14 |
| Linicor(500/20mg)錠 | Niacin/Lovastatin (500/20mg) | 理脂膜衣錠 |  更新日期:2014.11.7 |
| Zulitor(4mg)錠 | Pitavastatin(4mg) | 平脂膜衣錠 |  更新日期:2016.11.02 |

- 葡萄柚汁會與上述降血脂藥物有4級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內會發生。
- 葡萄柚汁主要會抑制遠端小腸黏膜上CYP3A4的作用，因此抑制了藥物的代謝而增加藥物的身體可用率，進而增加藥物血中濃度及發生不良反應的機會，如橫紋肌溶解症。服藥期間避免飲用葡萄柚汁。

藥品交互作用資料庫危象分級原則

| 交互作用等級 | 嚴重度 | 文獻資料佐證 |
|--------|------|---------|
| 1 | 重度 | 疑似等級或以上 |
| 2 | 中度 | 疑似等級或以上 |
| 3 | 輕度 | 疑似等級或以上 |
| 4 | 重/中度 | 可能 |
| 5 | 輕度 | 可能 |

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm

