

食物—藥物交互作用01

酒精與鎮靜安眠藥

酒精與下列鎮靜安眠藥有2級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內。酒精會增加下列鎮靜安眠藥的吸收，及降低鎮靜安眠藥於肝臟之代謝。

急性飲酒者，對於中樞神經之抑制作用有加成或協同的現象，而對於長期飲酒者，會增加鎮靜安眠藥之耐受性，也就是病人可能需要加重劑量才有效果。

商品名	學名	中文名	外觀
Xanax (0.5mg)	Alprazolam (0.5mg)	贊安諾	 <p>更新日期：2015.07.30</p>
Rivotril (2mg)	Clonazepam (2mg)	可那平錠	 <p>更新日期：2015.01.15</p>
Valium (2mg)	Diazepam (2mg)	當立平錠	 <p>更新日期：2015.12.08</p>
Valium (5mg)	Diazepam (5mg)	樂平片	 <p>更新日期：2015.01.16</p>

商品名	學名	中文名	外觀
Ativan (0.5mg)	Lorazepam (0.5mg)	安定文錠	 更新日期 2016.11.22
Ativan (2mg)	Lorazepam (2mg)	樂眠錠	 更新日期 2016.08.16
Eurodin (2mg)	Estazolam (2mg)	悠樂丁錠	 更新日期 : 2015.01.05
Dormicum (7.5mg)	Midazolam (7.5mg)	導美睡	 更新日期 : 2015.01.14

藥品交互作用資料庫危象分級原則

交互作用等級	嚴重度	文獻資料佐證
1	重度	疑似等級或以上
2	中度	疑似等級或以上
3	輕度	疑似等級或以上
4	重/中度	可能
5	輕度	可能

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm

奇美醫院：台南市永康區中華路901號

電話：(06)2812811分機53103

柳營奇美醫院：台南市柳營區太康里太康201號

電話：(06)6226999分機73101

佳里奇美醫院：台南市佳里區興化里佳里興606號

電話：(06)7263333分機33111



A5500035