






醫療財團法人

食物—藥物交互作用02

酒精與藥物

| | | |
|-----|---|--|
| 外觀 |  | <ul style="list-style-type: none"> · 酒精與Neotigason（新定康癬）有1級食物藥物交互作用，交互作用起始時間需幾天至幾週。酒精會增加Neotigason的轉酯化反應，易增加懷孕婦女致畸胎的風險。 · 酒精與Neotigason，禁用於預計懷孕的婦女。在停止服用Neotigason兩個月內亦不能飲酒。 |
| 商品名 | Neotigason (10mg) 膠囊 | |
| 學名 | Acitretin (10mg) 膠囊 | |
| 中文名 | 新定康癬 | |

| | | |
|-----|---|--|
| 外觀 |  | <p>酒精與Luminal（苯巴比特魯錠）有1級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內。急性攝取酒精，又同時使用Luminal，可能造成手眼協調障礙、中樞神經系統明顯抑制以及死亡。對於慢性酒精攝取者，若使用Luminal可能會造成Luminal的藥效明顯降低。酒精和Luminal併用已有死亡案例報告，但是否會發生 Luminal之藥效降低是無法預先知道。應避免同時併用酒精和Luminal。</p> |
| 商品名 | Luminal(30mg) | |
| 學名 | Phenobarbital (30mg) 錠 | |
| 中文名 | 苯巴比特魯錠 | |

| | | |
|-----|---|--|
| 外觀 |  | <p>酒精與Panadol（理冒伯樂止痛錠，俗稱普拿疼）有2級食物藥物交互作用，交互作用起始時間需幾天至幾週。對於長期有飲酒習慣者，若使用Panadol可能會增加肝損傷的風險，若長期飲酒者應避免使用劑量過大和長期使用Panadol；並建議病人戒酒。</p> |
| 商品名 | Panadol (500mg) 錠 | |
| 學名 | Acetaminophen (500mg) 錠 | |
| 中文名 | 理冒伯樂止痛錠 | |

| | | |
|-----|---|---|
| 外觀 |  | <p>酒精與Aspirin有3級食物藥物交互作用，交互作用起始時間需幾天至幾週。酒精可能會增加Aspirin引發胃腸出血的風險，並可能會造成延長出血；出血情形常發生於併用酒精與Aspirin後的36個小時。酒精與aspirin應間隔至少12小時；若要避免胃腸出血的風險，建議使用腸溶衣或緩釋劑型</p> |
| 商品名 | Bokey (100mg) 膠囊 Tapal (100mg) 錠 | |
| 學名 | Aspirin(100mg) | |
| 中文名 | 伯基、 阿司匹林膜衣錠 | |

藥品交互作用資料庫危象分級原則

| 交互作用等級 | 嚴重度 | 文獻資料佐證 |
|--------|------|---------|
| 1 | 重度 | 疑似等級或以上 |
| 2 | 中度 | 疑似等級或以上 |
| 3 | 輕度 | 疑似等級或以上 |
| 4 | 重/中度 | 可能 |
| 5 | 輕度 | 可能 |

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm

奇美醫院：台南市永康區中華路901號

柳營奇美醫院：台南市柳營區太康里太康201號

佳里奇美醫院：台南市佳里區興化里佳里興606號

電話：(06)2812811分機53103

電話：(06)6226999分機73101

電話：(06)7263333分機33111



A5500036