




# 食物—藥物交互作用05

## 葡萄柚汁與降血脂藥物

商品名	學名	中文名	外觀
Lipitor (40mg) 錠	Atorvastatin (40mg)	立普妥	 更新日期:2016.03.17
Vytorin (10/20mg) 錠	Ezetimibe/simvastatin (10/20mg)	維妥力錠	 更新日期:2015.04.14
Linicor(500/20mg)錠	Niacin/Lovastatin (500/20mg)	理脂膜衣錠	 更新日期:2014.11.7

- 葡萄柚汁會與上述降血脂藥物有4級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內會發生。
- 葡萄柚汁主要會抑制遠端小腸黏膜上CYP3A4的作用，因此抑制了藥物的代謝而增加藥物的身體可用率，進而增加藥物血中濃度及發生不良反應的機會，如橫紋肌溶解症。服藥期間避免飲用葡萄柚汁。

藥品交互作用資料庫危象分級原則

交互作用等級	嚴重度	文獻資料佐證
1	重度	疑似等級或以上
2	中度	疑似等級或以上
3	輕度	疑似等級或以上
4	重/中度	可能
5	輕度	可能

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：[http://www.chimei.org.tw/main/cmh\\_department/55500/drugsearch.htm](http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm)

