




食物—藥物交互作用07

葡萄柚汁與鎮靜安眠藥交互作用

注意事項

商品名	學名	中文名	外觀
Diapin(2mg) Dupin (5mg)	Diazepam	當立平錠(2 mg) 樂平片(5mg)	 更新日期:2015.12.08  更新日期:2015.01.16

- 葡萄柚汁會與Diazepam有2級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內會發生。
- 葡萄柚汁可能會使Diazepam藥理作用增強，並延緩開始作用時間約1.5至2小時；因此病人可能會增強嗜睡的情形。服藥期間應避免服用葡萄柚汁。

商品名	學名	中文名	外觀
Dormicum (7.5mg)	Midazolam (7.5mg)	導美睡	 更新日期:2015.01.14

- 葡萄柚汁會與Dormicum（導美睡）有2級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內會發生。
- 葡萄柚汁會抑制導美睡的代謝，導致延緩開始作用的時間，並且增加藥理作用，因此病人可能會增強嗜睡的情形。服藥期間應避免服用葡萄柚汁。

藥品交互作用資料庫危象分級原則

交互作用等級	嚴重度	文獻資料佐證
1	重度	疑似等級或以上
2	中度	疑似等級或以上
3	輕度	疑似等級或以上
4	重/中度	可能
5	輕度	可能

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm

