

Bromocriptine 歐普酪使用須知

學名	商品名	中文名	含量	藥品外觀	藥號
Bromocriptine	Volbro	歐普酪 膠囊	2.5mg /顆		23P081

◎ 作用

治療肢端肥大症、巴金森氏症、高泌乳素血症、高泌乳激素引起的不孕症、及抑制泌乳。

◎ 用法

遵照醫師處方按時按量服用。

◎ 注意事項

- 1.對Bromocriptine或其他麥角鹼藥物過敏者不可使用，請事先告知醫師。
- 2.本品禁用於未控制之高血壓或懷孕期間高血壓之患者。
- 3.懷孕之病人除非醫療上之原因需要繼續治療外，應停止使用本劑。
- 4.如有精神疾病、高血壓、嚴重心臟疾病、癲癇、胃潰瘍等，請事先告知醫師。
- 5.使用本藥品可能會產生嗜睡，須注意勿從事駕車等伴有危險性之機械操作。
- 6.酒精會增加本藥品之副作用，服藥期間避免飲酒。

◎ 相關副作用

開始治療後數天內，可能會輕微噁心。少數病人會暈眩、疲倦、嘔吐。

◎ 服藥與忘記服藥時之處置

本藥品應隨餐服用，可與食物或牛奶併服。若您是規律性的服用此藥，則請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。

◎ 藥品儲存處置

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得之處所。

※ 若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

·奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw

·柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw

·佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw

·藥物查詢網站：

http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm