

# 食物—藥物交互作用01

## 酒精與鎮靜安眠藥

酒精與下列鎮靜安眠藥有2級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內。酒精會增加下列鎮靜安眠藥的吸收，及降低鎮靜安眠藥於肝臟之代謝。

急性飲酒者，對於中樞神經之抑制作用有加成或協同的現象，而對於長期飲酒者，會增加鎮靜安眠藥之耐受性，也就是病人可能需要加重劑量才有效果。

商品名	學名	中文名	外觀
Xanax (0.5mg)	Alprazolam (0.5mg)	贊安諾	 更新日期：2015.07.30
Rivotril (2mg)	Clonazepam (2mg)	可那平錠	 更新日期：2015.01.15
Valium (2mg)	Diazepam (2mg)	當立平錠	 更新日期：2015.12.08
Valium (5mg)	Diazepam (5mg)	樂平片	 更新日期：2015.01.16

商品名	學名	中文名	外觀
Ativan (0.5mg)	Lorazepam (0.5mg)	安定文錠	 更新日期 2016.11.22
Ativan (2mg)	Lorazepam (2mg)	安心平錠	 更新日期:2017.11.07
Eurodin (2mg)	Estazolam (2mg)	悠樂丁錠	 更新日期：2015.01.05
Dormicum (7.5mg)	Midazolam (7.5mg)	導美睡	 更新日期：2015.01.14

#### 藥品交互作用資料庫危象分級原則

交互作用等級	嚴重度	文獻資料佐證
1	重度	疑似等級或以上
2	中度	疑似等級或以上
3	輕度	疑似等級或以上
4	重/中度	可能
5	輕度	可能

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

#### ◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：[http://www.chimei.org.tw/main/cmh\\_department/55500/drugsearch.htm](http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm)

奇美醫院：台南市永康區中華路901號

電話：(06)2812811分機53103

柳營奇美醫院：台南市柳營區太康里太康201號

電話：(06)6226999分機73101

佳里奇美醫院：台南市佳里區佳興里佳里興606號

電話：(06)7263333分機33111



A5500035