




# 食物—藥物交互作用02

## 酒精與藥物

外觀	 <p>更新日期：2015.01.22</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>酒精與Neotigason（新定康癬）有1級食物藥物交互作用，交互作用起始時間需幾天至幾週。酒精會增加Neotigason的轉酯化反應，易增加懷孕婦女致畸胎的風險。</li> <li>酒精與Neotigason，禁用於預計懷孕的婦女。在停止服用Neotigason兩個月內亦不能飲酒。</li> </ul>
商品名	Neotigason (10mg) 膠囊	
學名	Acitretin (10mg) 膠囊	
中文名	新定康癬	

外觀	 <p>更新日期：2015.01.15</p>	<p>酒精與Luminal（苯巴比特魯錠）有1級食物藥物交互作用，交互作用起始時間在24小時內。急性攝取酒精，又同時使用Luminal，可能造成手眼協調障礙、中樞神經系統明顯抑制以及死亡。對於慢性酒精攝取者，若使用Luminal可能會造成Luminal的藥效明顯降低。酒精和Luminal併用已有死亡案例報告，但是否會發生 Luminal之藥效降低是無法預先知道。應避免同時併用酒精和Luminal。</p>
商品名	Luminal(30mg)	
學名	Phenobarbital (30mg) 錠	
中文名	苯巴比特魯錠	

外觀	 <p>更新日期：2015.01.15</p>	<p>酒精與Panadol（理冒伯樂止痛錠，俗稱普拿疼）有2級食物藥物交互作用，交互作用起始時間需幾天至幾週。對於長期有飲酒習慣者，若使用Panadol可能會增加肝損傷的風險，若長期飲酒者應避免使用劑量過大和長期使用Panadol；並建議病人戒酒。</p>
商品名	Panadol (500mg) 錠	
學名	Acetaminophen (500mg) 錠	
中文名	理冒伯樂止痛錠	

外觀		<p>酒精與Aspirin有3級食物藥物交互作用，交互作用起始時間需幾天至幾週。酒精可能會增加Aspirin引發胃腸出血的風險，並可能會造成延長出血；出血情形常發生於併用酒精與Aspirin後的36個小時。酒精與aspirin應間隔至少12小時；若要避免胃腸出血的風險，建議使用腸溶衣或緩釋劑型。</p>
商品名	Espin (100mg) 膠囊 Tapal (100mg) 錠	
學名	Aspirin(100mg)	
中文名	安心平、 阿司匹林膜衣錠	

藥品交互作用資料庫危象分級原則

交互作用等級	嚴重度	文獻資料佐證
1	重度	疑似等級或以上
2	中度	疑似等級或以上
3	輕度	疑似等級或以上
4	重/中度	可能
5	輕度	可能

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

### ◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：[http://www.chimei.org.tw/main/cmh\\_department/55500/drugsearch.htm](http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm)

奇美醫院：台南市永康區中華路901號

柳營奇美醫院：台南市柳營區太康里太康201號

佳里奇美醫院：台南市佳里區佳興里佳里興606號

電話：(06)2812811分機53103

電話：(06)6226999分機73101

電話：(06)7263333分機33111



A5500036