

# 食物—藥物交互作用04

## 葡萄柚汁與藥物交互作用

商品名	學名	中文名	外觀
Claricin (250mg)	Clarithromycin (250mg)錠	特立適膜衣錠	
Erythromycin (250mg)	Erythromycin (250mg) 錠	紅黴素膠囊	

- 葡萄柚汁與特立適膜衣錠、紅黴素膠囊，有1級食物藥物交互作用，交互作用起始時間需幾天至幾週。
- 若服用特立適膜衣錠、紅黴素膠囊期間飲用葡萄柚汁，會抑制藥物的代謝，因而增加體內濃度與副作用，所以服藥期間應避免飲用葡萄柚汁。

藥品交互作用資料庫危象分級原則

交互作用等級	嚴重度	文獻資料佐證
1	重度	疑似等級或以上
2	中度	疑似等級或以上
3	輕度	疑似等級或以上
4	重/中度	可能
5	輕度	可能

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

### ◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：[http://www.chimei.org.tw/main/cmh\\_department/55500/drugsearch.htm](http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm)

奇美醫院：台南市永康區中華路901號

電話：(06)2812811分機53103

柳營奇美醫院：台南市柳營區太康里太康201號

電話：(06)6226999分機73101

佳里奇美醫院：台南市佳里區佳興里佳里興606號

電話：(06)7263333分機33111

